微载体 6 复合脂肪干细胞移植在肛瘻治疗中的应用*

李衍森¹ 范明峰¹ 乐瀚翔² 孔令玉¹ 洪 丰¹ 晁 民^{1△}
(¹济宁医学院附属医院, 济宁 272029; ²吉林大学第二医院, 长春 130041)

摘要 **目的** 探讨微载体 6 复合脂肪干细胞(Microcarrier 6-ADSC)治疗肛瘻的疗效,为肛瘻微创化治疗探索新途径。**方法** 采用日本大耳兔建立兔肛瘻模型,造模成功后随机分成 4 组:Microcarrier 6-ADSC 复合组、ADSC 治疗组、手术组和对照组,每组 6 只,病理 HE 染色观察不同治疗方法的效果。**结果** Microcarrier 6-ADSC 复合组和 ADSC 治疗组的瘻管组织中有散布的横纹肌细胞和上皮组织,少量淋巴细胞聚集在微载体 6 周围,在 ADSC 治疗组中可见到脂肪细胞聚集;对照组可见肉芽组织和淋巴细胞浸润并可见大量坏死组织。与手术组相比, Microcarrier 6-ADSC 复合组和 ADSC 治疗组的治愈时间明显缩短($P < 0.05$)。 **结论** Microcarrier 6 有利于 AD-SC 的多向分化,可为 ADSC 的生存提供良好环境,促进瘻管的愈合。

关键词 微载体 6-脂肪干细胞;细胞分化;肛瘻;疗效

中图分类号:R574.1 文献标识码:A 文章编号:20213951000-9760(2021)12-428-05

Application of microcarrier 6 compound adipose stem cell transplantation in the treatment of anal fistula

LI Yansen¹, FAN Mingfeng¹, LE Hanxiang², KONG Lingyu¹, HONG Feng¹, CHAO Min^{1△}
(¹Affiliated Hospital of Jining Medical University, Jining 272029, China;
²Second Hospital of Jilin University, Changchun 130041, China)

Abstract: Objective To investigate the efficacy of microcarrier 6 combined with adipose stem cells (microcarrier 6-ADSC) in the treatment of anal fistula, and explore a new approach to minimally invasive treatment of anal fistula. **Methods** The Japanese big-eared rabbits were used to establish rabbit anal fistula models. After successful modeling, they were randomly divided into four groups: microcarrier 6-ADSC composite group, simple ADSC treatment group, and surgery group and the control group, six rabbits per group, and the effects of different treatment methods were observed by pathological HE staining examination. **Results** There were scattered striated muscle cells and epithelial tissues in the fistula tissues of the microcarrier 6-ADSC composite group and the simple ADSC treatment group, a small amount of lymphocytes gathered around the microcarrier 6, and adipose cells could be seen in the simple ADSC treatment group; the control group showed granulation tissue and lymphocyte infiltration and a large amount of necrotic tissue. Compared with the surgery group, the healing times of the microcarrier 6-ADSC composite group and the ADSC treatment group were significantly shorter ($P < 0.01$). **Conclusion** Microcarrier 6 is conducive to the multidirectional differentiation of ADSCs, provides a good environment for the survival of ADSCs, and promotes the healing of fistulas.

Keywords: Microcarrier 6-Adipose stem cells; Cell differentiation; Anal fistula; Curative effect

* [基金项目] 国家自然科学基金项目(81170395); 山东省卫生健康委员会项目(2016WS0166)

△ [通信作者] 晁民, E-mail: cmys333@sina.com,

肛瘻即肛门直肠瘻,是由肛门直肠脓肿破溃或切开排脓后形成的肛门直肠周围肉芽肿性管道^[1];其临床特征为肛门反复疼痛、瘙痒、流脓水,难以愈合,影响患者生存质量^[2]。肛瘻发病机理尚不明确,手术是其主要治疗方法,但创面大、损伤重、相关并发症多^[3]。有研究报道脂肪干细胞(ADSC)可治愈肛瘻^[4],且治疗复杂性肛瘻,具有微创、无肛门括约肌损伤、痛苦小、住院时间短等优势^[5]。微载体 6(Microcarrier 6)是由带正电的有机聚合物复合材料组成,具有多层多孔结构、利于细胞生长,具有抗污染,免疫原性低,生物相容性和新陈代谢性好的特点^[6]。为使 ADSC 在肛瘻的治疗中发挥更好的作用,本研究使用 Microcarrier 6 复合 ADSC 通过组织工程技术修复肛瘻周围的受损组织,为临床肛瘻微创化治疗探索新路径。

1 材料与方 法

1.1 材 料

1.1.1 动物 24 只 4 月龄大的日本大耳兔,雌雄不限,每只体重 2.0~4.0kg,由济南金丰实验动物有限公司提供。实验室动物质量证书编号:37009700000659,许可证编号:SCXK(山东)20180006;所有动物实验程序均符合规定,并由济宁医学院附属医院动物伦理委员会(批准号:2018-FY-002)审查和批准。

1.1.2 试剂与仪器 RPMI-1640 培养基,胶原酶 I,胎牛血清(FBS),红细胞裂解缓冲液(ACK),1×PBS 和胰蛋白酶购自 Gibco(US);Microcarrier 6 由 Elyon Bio-Technologies LLC(美国)提供;肛瘻刮除刀购自由山东赛诺医疗器械有限公司。

1.2 方 法

1.2.1 兔肛瘻模型的制备 家兔全麻后固定四肢,剪除肛周皮毛并完全暴露肛门,碘伏常规消毒家兔肛门及其周围皮肤,使用温控电刀在兔肛周距肛缘 0.5~1cm 制造肛瘻外口,在肛肠镜引导下从兔肛门距肛缘 0.5~0.7cm 肛管内穿出,瘻管造膜完成,探针尾部系一橡皮条,在探针引导下,使橡皮条经瘻管外口进入,穿入瘻管,自内口穿出,结扎橡皮条两端,使橡皮条浮挂于瘻管内,造膜结束。造膜完成后给予造模动物配备防咬装置,防止咬断橡皮筋、舔咬瘻管伤口;26d 后去除橡皮筋,经专业两位肛肠外科医师检查并探针检查确定造模成功^[7]。

1.2.2 ADSC 的提取和培养 家兔全麻后,将四

肢固定,准备好手术区域的皮肤,然后用碘伏常规消毒并覆盖无菌洞巾。在兔子的后背部做一个大约 4cm 长的正中切口,分离皮下组织,每只兔子取出约 5~9g 脂肪组织,将脂肪组织放入无菌培养盘中,并用生理盐水洗涤,去除多余的头发和血迹,并用 PBS 进一步洗涤细胞 2~3 次,在无菌条件下去除包膜,结缔组织和血管,用小剪刀将脂肪组织切成约 1mm 大小的 3 块,并在 37℃ 的恒温振荡器上用 5ml 的 0.05% 胶原酶 I 消化 60min,接着加入含有 10% FBS 的 RPMI-1640 培养基以终止消化。将悬浮液以 1000r/min 离心 5min,并丢弃上层中的脂质滴和上清液,将细胞重悬于 PBS 中并通过 200 目滤器;随后以 1000r/min 离心 5min,弃去上清液。然后将细胞重悬于含有 10% FBS 的 RPMI-1640 培养基中,接种到 6 孔板中,并在 5% CO₂ 培养箱中于 37℃ 培养。根据细胞的生长状态,每 3~4 天更换 1 次培养基。将原代细胞培养大约 2 周后,用 0.25% 的胰蛋白酶消化并传代。在倒置显微镜下观察细胞的形态变化。培养传至第三代后,拍照并收集细胞。

1.2.3 Microcarrier 6-ADSC 复合物的构建 将 Microcarrier 6 浸泡在 75% 的乙醇中 24h,然后用 PBS 洗涤 3 次,后将 Microcarrier 6 在 RPMI-1640 培养基中孵育 24h。用基质细胞衍生因子-1 α (SDF-1 α)和血管内皮生长因子(VEGF)修饰 Microcarrier 6,浓度均为 100ng/mL,孵育 3h,收获处于对数期生长阶段的细胞,通过使用锥虫蓝,发现活细胞百分比超过 95%,并将细胞浓度调整为 2 $\times$ 10⁷ 个/mL,将 ADSC 悬浮液与修饰的 Microcarrier 6 混合并在 5% CO₂ 培养箱中在 37℃ 下培养 24h,以使细胞在 Microcarrier 6 上(在显微镜下)达到饱和状态。

1.2.4 动物分组 成功建立模型后,将其中的 24 只兔随机分为 4 组:Microcarrier 6-ADSC 复合组,自体 ADSC 治疗组(简称 ADSC 治疗组),橡皮筋挂线手术组(简称手术组)和对照组,每组 6 只;Microcarrier 6-ADSC 复合组接种 200 μ l 2 $\times$ 10⁷ 个/ml 混合悬浮液,ADSC 治疗组接种 200 μ l 2 $\times$ 10⁷ 个/ml ADSC 悬浮液,对照组接种 200 μ l 1 $\times$ PBS 溶液。

1.2.5 各组动物手术步骤 1) 各组家兔创削瘻管内壁,用亚甲蓝稀释液(0.5:6~0.5:2)从肛瘻外口注入,内口有蓝液流出,确定好内口位置,用肛瘻刮除刀创削瘻管内壁 1~3 次,肉眼观察没有染色

组织即可;2) 采用 3/0 可吸收线对各组家兔肛瘘的肛管内部开口进行全层缝合。完成后,通过肛瘘的外口将少量生理盐水注入瘘管创腔内,如果没有液体从肛瘘的内部开口漏出,则确定肛瘘的内口已成功关闭;3) ADSC 治疗组注射自体 ADSC 悬浮液,将 $100\mu\text{l}$ 2×10^7 个/ml 的细胞悬液注射到瘘管创腔周围的组织中。为了使细胞分布更均匀,每次以小剂量进行多点注射,形成多个 $<2\text{mm}$ 的微囊泡,将剩余的 $100\mu\text{l}$ 液体通过肛瘘的外口均匀地注入瘘管创腔内,在注射过程中,注射点保持在离瘘管壁 $1\sim 5\text{mm}$;同法 Microcarrier 6-ADSC 复合组注射 $200\mu\text{l}$ Microcarrier 6-ADSC 混合悬浮液,对照组注射 $200\mu\text{l}$ $1\times\text{PBS}$ 溶液。4) 手术组沿瘘管的方向,将探头从瘘管的外口缓慢插入,然后从瘘管的内口引出,探头末端弯曲并从肛门引出,将一根带有橡皮筋的 7 号丝线绑在探头末端,然后将其与橡皮筋一起从内向外拉出,以使橡皮筋贯穿整个瘘管,切开瘘管内部和外部开口之间的皮肤以暴露括约肌,抬高并拉紧橡皮筋,紧贴肌肉组织用血管钳钳夹橡皮筋下方用 7 号丝线进行结扎。上述操作完成后,将兔子按不同的组进行单只饲养。每天或隔 2~3d 观察兔瘘管内外口的愈合情况。

1.2.6 HE 染色

石蜡组织切片 $4\mu\text{m}$ 厚度,贴于载玻片上,经过

二甲苯脱蜡,梯度酒精,水化,分别苏木素和伊红染液(福州迈新公司)染色,后经梯度酒精脱水,二甲苯透明后,滴加中性树胶后封片,显微镜下观察。

1.3 统计学方法

采用 SPSS 16.0 统计学软件对数据进行分析,计量资料的表示用 $\bar{x}\pm s$ 。采用方差分析进行各组间总体比较,SNK-*q* 检验做进一步两两比较,以 $P<0.0167$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 ADSC 的形态学

原代细胞培养 1d 后,发现一些细胞是圆形的,具有可见的细胞核黏附在培养瓶壁上;第 2 天,贴壁细胞数量增加,一些贴壁细胞变形,细胞直径增加;在第 3 天,细胞逐渐伸长成多边形;在第 7 天,黏附的 ADSC 呈现出均匀的形态和长的纺锤形;在第 12 天,大多数黏附细胞融合,呈现集落状分布和鱼群状排列(图 1a)。培养 2 周后,细胞均匀分布,大部分为长纺锤形,中间有核;细胞传代后,细胞迅速附着在壁上,具有相对均匀的形态和很少的异形细胞;细胞呈现出集落状或鱼群状的排列方式(图 1b)。用胰蛋白酶消化后,ADSC 变成单细胞悬液,与 Microcarrier 6 孵育 4 h 后发现,ADSC 可均匀地黏附在 Microcarrier 6 上并达到饱和状态(图 1c)。

注:a. 在第 12 天,大多数贴壁细胞被融合,呈现集落状分布和鱼群状排列;b. 细胞传代后表现为集落状或鱼群状排列模式;c. ADSC 与 Microcarrier 6 结合良好,分布均匀,达到饱和状态

图 1 ADSC 的形态学观察电镜图($\times 63$)

2.2 各组病理 HE 染色情况

肛瘘治疗 3 周后,在全麻醉下切除肛瘘创腔组织,行病理检查评估。Microcarrier 6-ADSC 复合组、ADSC 治疗组所有肛瘘均愈合,在肛瘘创腔部位有纤维状肉芽组织,HE 染色显示:在 Microcarrier 6-ADSC 复合组中 Microcarrier 6 周围观察到了少量淋巴细胞浮着(图 2a),Microcarrier 6 未被周围组织完全吸收,免疫刺激在局部组织中的反应;

ADSC 治疗组在肛瘘创腔部位有许多脂质囊泡(图 3b),ADSC 分化的脂肪组织充填了瘘管创腔;手术组瘘管虽愈合,但肛周组织明显缺损畸形,肉芽组织和淋巴细胞浸润(图 2c),可能由于在穿线刺激下瘘管周围组织的反应性增生所致;对照组肛瘘未愈合,在瘘管腔内存在大量坏死组织,大量淋巴细胞浸润(图 2d)。

注: a. Microcarrier 6-ADSC 复合组; b. ADSC 治疗组; c. 手术组; d. 对照组

白色箭头, 微载体; 黑色箭头, 深蓝染色的淋巴细胞; 红色箭头和区域, 多脂质囊泡(脂肪细胞); 黄色区域, 坏死; 黑色区域, 淋巴细胞浸润; 白色区域, 纤维和胶原

图 2 各组病理 HE 染色检测图(标尺, 100 μ m)

2.3 各组肛瘻愈合情况

肛瘻治疗后, 每天或隔 2~3d 观察一次伤口愈合过程, 共 3 周。所有动物在手术和观察期间均存活。各组之间的体重无差异, Microcarrier 6-ADSC 复合组、ADSC 治疗组、手术组所有肛瘻均愈合, 对照组没有愈合; 与手术组相比, ADSC 治疗组和 Microcarrier 6-ADSC 复合组治愈时间显著缩短 ($P < 0.01$); 与 ADSC 治疗组相比, Microcarrier 6-ADSC 复合组的愈合时间稍长, 但差异无统计学意义 ($P > 0.05$)。见表 1。

表 1 Microcarrier 6-ADSC、自体 ADSC 移植与常规手术在肛瘻治疗中的愈合时间比较

组别/指标	体重/g	愈合时间/d
Microcarrier 6-ADSC 复合组	3.53 $\pm$ 0.58	8.00 $\pm$ 1.41 ^{*#}
ADSC 治疗组	3.38 $\pm$ 0.62	5.75 $\pm$ 1.26 ^{*#}
手术组	3.30 $\pm$ 0.88	15.00 $\pm$ 1.41
<i>F</i>	0.105	50.02
<i>P</i>	0.901	0.001

注: 与手术组相比, * $P < 0.01$; # 与 ADSC 治疗组相比, $P > 0.05$

3 讨论

近年来生物学治疗成为国内外专家共同研究的热点, 特别是随着分子生物学技术进步, 各类生物材质逐步应用于肛瘻的治疗术中, 其中比较新颖的技术用在肛瘻治疗的主要有: 纤维蛋白凝胶封堵术、生物补片内口封闭术、皮肤胶原注射术、脂肪填充技术以及异体脱细胞真皮基质(肛瘻栓) 堵塞

术^[3]等; 这些术式的出现, 减少了对瘻管周围正常的结缔组织和括约肌的损伤, 一定程度地保护了肛门括约肌的功能, 但由于其治愈率不高, 而且价格较贵, 一直处于试验阶段, 仍未进入临床应用中。肛瘻治疗方法主要有中西药物治疗、外科治疗、新兴的生物治疗模式及干细胞微创治疗。药物治疗有一定的疗效能缓解症状, 中医药通过辨证施治, 可以增强肛瘻患者体质, 改善临床症状, 促进术后创面愈合等, 但都不能治愈肛瘻。经典传统的手术方式是肛瘻切开或肛瘻切除术, 对于低位单纯性肛瘻治愈率高, 括约肌损伤小, 但其对于复杂性肛瘻则存在括约肌保护不足的问题, 术后肛门失禁发生率较高, 切割挂线术曾是治疗复杂性肛瘻的主要方法, 在一定程度上可以保护括约肌功能。但研究表明, 其术后肛门失禁率仍高达 34%~63%, 术后疼痛剧烈^[8]。

国内外用 ADSC 移植治疗肛瘻特别是克罗恩的复杂性肛瘻疗效和安全性虽得到了初步认证^[9], 但目前仍停留在临床观察研究方面, 且样本量少, 疗效需待进一步提高。ADSC 移植治疗肛瘻还存在诸多临床应用前需要解决的问题, 其机理尚未明确。ADSC 是一种间充质干细胞, 在人体内大量存在, 很容易地收获; ADSC 具有自我再生和多向分化的潜力; 其可以促进许多血管生成因子和抗凋亡因子的分泌^[8]。因此, ADSC 可用作肛门瘻的治疗, 促进伤口组织修复和伤口表面愈合的种子细胞。目前, ADSC 治疗肛瘻的研究仍处于探索阶段, 关于 ADSC 脂肪组织的来源, 分离和培养的工作流程, 注射剂量和频率尚无共识。已发现使用支架可以提高移植细胞的存活率和生物学功能, 支架提供了一种网状结构, ADSC 黏附在其上以形成微结构, 将其混合物注射到病变中后, 它们可导致肛瘻创腔内微环境变化, 从而对治疗产生协同作用。

本文结果显示 Microcarrier 6-ADSC、ADSC 的移植疗法都可改善肛瘻预后, 通过比较 Microcarrier 6-ADSC 和自体 ADSC 移植治疗愈合后的肛瘻组织病理切片, 我们发现少量淋巴细胞浸润了 Microcarrier 6 附近的组织, 这可能是因为 Microcarrier 6 并未被周围组织完全吸收。因此, 可以根据移植的 ADSC 的量减少 Microcarrier 6 的量, 以达到肛瘻快速创面愈合的预期。根据我们的实验发现和现有临床研究的回顾, 可以得出以下 (下转第 436 页)

- 社, 1999; 339-344.
- [12] Tabachnick BG, Fidell LS. Using multivariate statistics (6th ed) [M]. New Jersey: Person Education, Inc, 2013; 574-576.
- [13] 万崇华, 罗家洪. 高级医学统计学[M]. 北京: 科学出版社, 2014; 170-173.
- [14] Miltner KM, Baym NK. The selfie of the year of the selfie: reflections on a media scandal [J]. Int J Commun, 2015, 9(1): 1701-1715.
- [15] 李晴晴, 刘毅. 身体意象失调的成因: 基于“镜中自我”的视角 [J]. 心理科学进展, 2018, 26(11): 2013-2023. DOI: 10.3724/SP. J. 1042. 2018. 02013.
- [16] 李青青, 李小霞, 杨静怡. 自拍相关行为对医学院女生客体化意识的影响: 外貌评价的中介作用 [J]. 济宁医学院学报, 2020, 43(5): 347-351. DOI: 10.3969/j. issn. 1000-9760. 2020. 05. 010.
- [17] Cash TF, Pruzinsky T. Body image: a handbook of theory, research, and clinical practice [M]. Guilford A Division of Guilford Publications Inc, 2011; 374-376.
- [18] 杜晓红, 唐东辉, 陈永发. 当代大学生身体自我特点研究 [J]. 天津体育学院学报, 2005(6): 49-52. DOI: 10.3969/j. issn. 1005-0000. 2005. 06. 010.
- [19] 房丞. 上海市中学生身体自我概念现状及其与体育锻炼的关系研究 [D]. 上海: 上海师范大学, 2015.
- [20] Lindner D, Tantleff-Dunn S, Jentsch F. Social comparison and the circle of objectification [J]. Sex Roles, 2012, 67(3): 222-235. DOI: https://doi.org/10.1007/s11199-012-0175-x.
- [21] 郝自新. 面孔吸引力和社会身份信息对大学生初始信任判断的影响研究 [D]. 沈阳: 沈阳师范大学, 2019.

(收稿日期 2021-09-22)

(本文编辑: 石俊强)

(上接第 431 页) 结论: 与传统的外科橡皮筋挂线手术相比, Microcarrier 6-ADSC 的移植治疗肛瘘具有较小的浸润性, 对括约肌的无损害, 疼痛较小且愈合速度更快的优点, 可以初步确定 Microcarrier 6 能促进 ADSC 在瘘管创腔内更好的分化, 但由于 Microcarrier 6 浓度高、吸收慢未达到理想的预期; 如果用这次 Microcarrier 6 实验量的 20%~50% 或用自体脂肪制作 3D 支架会明显缩短愈合时间, 这是下一步课题研究目标。随着生物降解材料的快速发展, ADSC 可以与生物材料结合使用, 以促进 ADSC 在临床治疗中的应用, 有望为患者开发更个性化的治疗方案。

利益冲突: 所有作者均申明不存在利益冲突。

参考文献:

- [1] 吕长遥, 伍静, 何洪波. 肛瘘微创手术治疗进展 [J]. 现代中西医结合杂志, 2018, 27(1): 106-111. DOI: 10.3969/j. issn. 1008-8849. 2018. 01.
- [2] 史瑞霞, 王业皇. 肛瘘的微创治疗进展 [J]. 湖南中医杂志, 2012(3): 174-175.
- [3] 樊文彬, 侯艳梅, 赵安琪, 等. 肛瘘治疗新进展及实用性探讨 [J]. 中国普通外科杂志, 2018, 27(12): 1603-1608. DOI: 10.7659/j. issn. 1005-6947. 2018. 12. 017.
- [4] Qin X, Wang P, Huang Y, et al. Adipose-derived stem cells are an efficient treatment for fistula-in-ano of Japanese rabbit [J]. Stem Cells Int, 2019, 2019: 6918090. DOI: 10.1155/2019/6918090.
- [5] 江滨, 时宏珍, 史央, 等. 自体脂肪干细胞移植治疗复杂性肛瘘的临床观察 [J]. 中华结直肠疾病电子杂志, 2019, 8(6): 566-573. DOI: 10.3877/cma.j. issn. 2095-3224. 2019. 06. 005.
- [6] 毕研贞, 孔令斌, 洪丰, 等. 基于 Microcarrier6 构建正常免疫小鼠人胃癌移植模型 [J]. 中国肿瘤临床, 2017, 44(5): 199-203.
- [7] 张静锋, 高树波, 王鹏, 等. 自体脂肪间充质干细胞移植治疗肛瘘的实验研究 [J]. 中国肛肠病杂志, 2021, 41(4): 1-4. DOI: 10.3969/j. issn. 1000-1174. 2021. 04. 001.
- [8] Williams JG, MacLeod CA, Rothenberger DA, et al. Seton treatment of high anal fistulae [J]. Br J Surg, 1991, 78(10): 1159-1161. DOI: 10.1002/bjs. 1800781004.
- [9] Kocan B, Maziarz A, Tabarkiewicz J, et al. Trophic activity and phenotype of adipose tissue-derived mesenchymal stem cells as a background of their regenerative potential [J]. Stem Cells Int, 2017, 2017: 1653254. DOI: 10.1155/2017/1653254.

(收稿日期 2021-05-26)

(本文编辑: 石俊强)